



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 03, ημερομηνίας 13/06/2012 για διεύρυνση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

χορηγείται τροποποιημένη άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ...LENTAGRAN 45WP... με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2759

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

11/01/2013

Ημερομηνία λήξης άδειας:

22/05/2014

2. Κάτοχος της άδειας:

Belchim Crop Protection N.V. / S. A.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	200γρ., 500γρ., 1Kg	Σακούλα Polythylene Al και κουτί χάρτινο
2	Σακούλα	5Kg, 10Kg, 15Kg και 20Kg	PE ή PET/PE ή AL/ PET/ PE.

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής, για καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και στενόφυλλων ζιζανίων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος μετά το φύτευμα όλων των ζιζανίων όταν η καλλιέργεια είναι στο σωστό στάδιο ανάπτυξης.
Χρήση ακροφυσίων χαμηλής πίεσης (όχι μεγαλύτερης από 3Ατμ.)

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται μέχρι το πέρας του ψεκασμού. Μετά το ψεκασμό ξεπλύνετε τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις *		Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. max.	
Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικα λάχανα Μη κεφαλωτές κράμβες) Αγκινάρα Σπαράγγι Ανθοκράμβες: (Μπρόκολο, Κουνουπίδι) Κεφαλωτές κράμβες: (Λαχανάκια βρυξελλών Κραμπί) Αρωματικά φυτά Γογγυλοκράμβες Γλυκό καλαμπόκι Σκόρδο Πράσο Κρεμμύδι Ασκαλώνια Όσπρια: (Μπιζέλι, Ρεβύθια, Φασόλια Φακή) Μηδική	Αμάραντος (<i>Amaranthus retrofl exus</i>) Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) Αγριοτομάτα (<i>Solanum nigrum</i>) Αγριομπαμπακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>) Κολιτσίδα (<i>Galium aparine</i>) Ανθεμίδα (<i>Anthemis arvensis</i>)(<i>Bidens tripartita</i>) Κόνυζα (<i>Erigeron canadensis</i>) Λάμιο (<i>Lamium spp.</i>) (<i>Stachus annua</i>) Λιθόσπερμο (<i>Lithospermum arvense</i>) Γκαλινσόγκα (<i>Galinsoga spp.</i>) Αγριοχαμόμηλο (<i>Marticaria chamomilla</i>) Σκαρολάχανο (<i>Mercurialis annua</i>) Καφέλλα (<i>Capsella bursa pastoris</i>) Καπνόχορτο (<i>Fumaria officinalis</i>) Γκαλέοψις (<i>Galeopsis spp.</i>) Αγριόβικος (<i>Vicia spp.</i>) Πολυκόμπι (<i>Polygonum convolvulus</i>) Λαπάτσα (<i>Polygonoum lapathifolium</i>)	20 – 60	200	Ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων
Καπνός	Αναγαλίδα (<i>Anagallis arvensis</i>) Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) Σπεργούλα (<i>Spergula arvensis</i>) Θλάσπι (<i>Thlaspi arvense</i>) Μικρή τσουκνίδα (<i>Urtica urens</i>) «Στάδιο 3 φύλλων» Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Αιματόχορτο (<i>Digitaria spp.</i>) Σετάρια (<i>Setaria spp.</i>)	10	100	

*** Δόσεις**

Στάδιο Ζιζανίου	Κοτυληδόνα/ 1 φύλλο	1 έως 2 φύλλα	3 έως 6 φύλλα	Πάνω από 7 φύλλα
Δόση Lentagran 45 WP	50	100	150	200
Αριθμός εφαρμογών	1 – 3	1 – 2	1	1

Παρατηρήσεις:

- Για καλύτερη καταπολέμηση εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία ημέρας είναι πάνω από 10°C. Μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία τη νύκτα είναι κάτω από 2°C και την ημέρα ξεπερνά τους 18°C.
- Εφαρμόζεται μόνο όταν η καλλιέργεια είναι στεγνή.
- Στα κραμβοειδή, καταπολεμεί μεταξύ άλλων ετήσιων πολυετών ζιζανίων, τα *Chenopodium* sp. (λουβουδιά), *Sonchus* sp. (ζωχός), *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος), *Matricaria* sp. (χαμομήλι), *Thlaspi arvense* (Θλάσπι), *Anthemis arvensis* (ανθεμίδα), *Galinsoga* sp., *Stellaria media* (στελλάρια), *Capsella bursa-pastoris* (καφέλα), *Lamium* sp.(λάμιο), *Viola arvensis* (Αγριοπανσές), *Datura stramonium* (Τάτουλας), *Urtica urens* (Τσουκνίδα)
- Στον καπνό καταπολεμεί τα ετήσια πολυετή ζιζάνια *Solanum nigrum* (αγριοτομάτα), *Datura* sp. (Τάτουλας), *Urtica urens* (Τσουκνίδα), *Erigeron* sp., *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος). Είναι επίσης αρκετά αποτελεσματικό για τα ζιζάνια *Stellaria media* (στελλάρια), *Chamomilla recutita* (χαμομήλι), *Convolvulus arvensis* (περιπλοκάδι), *Amaranthus* sp. (βλήτο). Διαθέτει χαμηλή αποτελεσματικότητα για τα ζιζάνια *Portulaga oleracea* (γλυστουρίδα), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Polygonum* sp. (πολυκόμπι), *Rumex* sp. (λάπαθο).

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Σκόρδο, Ασκαλώνια, Κρεμμύδι	21 ημέρες
Πράσο, Καπνός, Μηδική	28 ημέρες
Φυλλώδεις κράμβες, Αγκινάρα, Κεφαλωτές κράμβες, Αρωματικά φυτά, Γογγυλοκράμβες, Μπρόκολο	42 ημέρες
Όσπρια	45 ημέρες
Κουνουπίδι	49 ημέρες
Γλυκό καλαμπόκι, Σπαράγγι	Μη εφαρμόσιμο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: C3

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

48 ώρες

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

Να μην εφαρμόζεται πριν ή μετά από 14 μέρες από την εφαρμογή άλλου φυτοφαρμάκου

11. Σήμανση φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Xi - Ερεθιστικό, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

12. Φράσεις κινδύνου:

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

13. Φράσεις ασφαλείας:

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα

S57 Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας

SPe1 Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους)

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι την παρακείμενη μη γεωργική γη

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.”

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα, κρατήστε το ήσυχο και διατηρήστε την κανονική θερμοκρασία του σώματος. Αν υπάρχουν προβλήματα με την αναπνοή καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια ξεπλυθείτε με ζεστό νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός εμμένει καλέστε γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλη ποσότητα νερού. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του.

Συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:11/01/2013.....

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα