

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος GibGro 20TB με αριθμό εγγραφής 2794

05 Οκτωβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: Nufarm S.A.S

Εμπορικό Όνομα: GibGro 20TB

Μορφή: Δισκία (TB)

Εγγραμμένη σύνθεση: gibberellic acid 20% β/β

βοηθητικές ουσίες 77.78 % β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: gibberellic acid 90 w/w min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Nufarm Americas, Inc

Παρασκευαστής σκευάσματος: Amerilab Technologies, USA

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Ρυθμιστής ανάπτυξης – επηρεάζει την ποσότητα, ποιότητα και χρόνο συγκομιδής

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως μέχρι απορροής

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε τον απαιτούμενο αριθμό δισκίων σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστήρα. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά.

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (δισκία/100 λ νερό)	Αριθμός Εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Σουλτανίνα για επιτραπέζια χρήση	Αύξηση καρπόδεσης, πρωίμηση παραγωγής	2-4	2	α. Στην πλήρη άνθηση* β. Μετά από 5-12 ημέρες
Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας	Αύξηση του μεγέθους της ράγας	0,2-0,6	2	Όταν οι ράγες έχουν αποκτήσει μέγεθος 3mm (σκαγιού)
Αγκινάρα	Πρωίμηση και αύξηση παραγωγής	1,6-3,5	3	Όταν εμφανιστούν 6-8 φύλλα ή 8-12 φύλλα για φυτά ενός έτους **
Σέλινο	Πρωίμηση και αύξηση παραγωγής και μήκους του στελέχους	5-7	1	4 βδομάδες πριν την συγκομιδή***

\* Προσέξτε να βραχούν καλά τα τσαμπιά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε 2 φορές:  
α. Όταν το 70% των πυλιδίων έχουν πέσει (στην πλήρη άνθηση) και β. Κατά την καρπόδεση, δηλ. 5-12 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό, ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής

\*\* Συνιστώνται 3 συνολικά ψεκασμοί σε διάστημα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Πρέπει να αυξηθεί συγχρόνως η λίπανση κατά 30% και να εξασφαλιστεί επαρκής άρδευση με κατάλληλο νερό. Εάν το νερό είναι αλατούχα, να αποφεύγεται η πολύ πρωίμη χρήση του σκευάσματος

\*\*\* Ο ψεκασμός να προγραμματίζεται στον αγρό κατά τμήματα ανάλογα με το χρόνο συγκομιδής

Συνίσταται να εφαρμόζεται με προσθήκη προσκολλητικής ουσίας.

Οι ψεκασμοί να γίνονται τις ψυχρές ώρες την ημέρας

**Χρόνος ασφαλείας:** Σέλινο 7 ημέρες

**Φυτοτοξικότητα:** ..... Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και .....  
..... δόσεις εφαρμογής.....

**Συνδυαστικότητα:** ..... Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά διαλύματα.....

**Σήμανση τοξικότητας:** Xi-Ερεθιστικό

**Φράσεις κινδύνου:**

**R36** Ερεθίζει τα μάτια

**Φράσεις ασφάλειας**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

**S23** Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα

**Μην μολύνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο**

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας**

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.