

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Corsario 20SL με αριθμό εγγραφής ...2797...

05 Οκτωβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: SAPEC Agro S.A., Portugal

Εμπορικό Όνομα: Corsario 20SL

Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: imidacloprid 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 82,60% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
imidacloprid 98% min

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: SAPEC Agro S.A., Portugal

Παρασκευαστής σκευάσματος: SAPEC Agro S.A., Portugal

Διανομέας: MEDGROW LTD

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως ή ριζοποτίσματα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	Εριώδης αλευρώδης	75	2	30
	Φυλλοκνίστης	50-75		
Καρυδιά	Αφίδες	50	2	14
		ριζοπότισμα: 10-40 κ.εκ/ δένδρο		
Μηλιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
Αχλαδιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
	Ψύλλα της αχλαδιάς	60		
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκκιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
Δαμασκηνιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	21
Κερασιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	28
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	3
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	Αλευρώδεις	50	2	3
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		
Κραμβοειδή	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	28
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		

Πατάτες	Αφίδες	25-30	1	30
Καπνός	Αφίδες	25-30	2	14
Καλλωπιστικά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	-

Διαχείριση ανθεκτικότητας:..... **Ομάδα Τρόπου Δράσης:** **4A**.....

Παρατηρήσεις:

- Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.

- Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωτοκία.

- Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.

- Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.

Φυτοτοξικότητα:..... Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής......

Σήμανση τοξικότητας:..... -

Φράσεις κινδύνου:

R57 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.....

Βλαβερό για τα πουλιά.....

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.....

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.....

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.....

S23 Μην αναπνέετε τους ατμούς / ψεκαστικό νέφος.....

S24/25 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.....

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

S57 Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή από το χώρο της έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγήσετε τίποτα στον ασθενή εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.