

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Previcur Energy SL με αριθμό εγγραφής 2807.

27 Νοεμβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: Bayer CropScience AG, Germany

Εμπορικό Όνομα: Previcur Energy SL

Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: propamocarb-HCL 53% β/ο

fosetyl- Al 31% β/ο

βοηθητικές ουσίες 25,2% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

propamocarb-HCL 92% w/w min.

fosetyl- Al 96% w/w min.

Παρασκευαστής δραστικών ουσιών: Bayer CropScience AG, GERMANY

Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer CropScience AG, GERMANY

Διανομέας: Costas Christodoulou Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί στα σπορεία, εφαρμογές με πότισμα, ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόση	Στάδιο εφαρμογής	Αριθμός Εφαρμογών
Σπορεία Τομάτα Μελιτζάνα Αγγούρι Πεπόνι Μαρούλι	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>)	3 κ.εκ. / τετραγωνικό μέτρο (m ²) (Όγκος νερού: 2 λίτρα / m ²)	Εφαρμογές στο σπορείο*	2 εφαρμογές: Μία εφαρμογή μετά τη σπορά και μία εφαρμογή μετά τη βλάστηση των σπόρων (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες)
Πιπεριά		6 κ.εκ. / m ² (Όγκος νερού: 2 λίτρα / m ²)		1 εφαρμογή
Θερμοκήπιο Τομάτα Πιπεριά Αγγούρι Πεπόνι Μαρούλι	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>)	300 κ. εκ. / δεκάριο (Όγκος νερού: 300 λίτρα / δεκ.)	Ριζοτόπισμα	- Καλλιέργεια στο έδαφος: 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες - Καλλιέργεια σε τεχνητά υποστρώματα: 4 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες
Υπαιθρο Μαρούλι				Περωνόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**1. Εφαρμογές με ριζοτόπισμα:**

Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Μαρούλι : 3 ημέρες
Πεπόνι: 14 ημέρες

2. Ψεκασμός Φυλλώματος

Μαρούλι : 21 ημέρες

Λαχανικά με βρώσιμη ρίζα και λαχανικά του γένους *Allium* που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων, μπορεί να φυτευτούν ή να σπαρθούν στο ίδιο υπόστρωμα μετά την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.

Φυλλώδη, στελεχώδη και καρποφόρα κηπευτικά και σταυρανθή μπορεί να φυτευτούν ή να σπαρθούν μετά την πάροδο 60 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης propramocarb hydrochloride: **28**
 Ομάδα Τρόπου Δράσης fosetyl-AI: **33**

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στην καλλιέργεια όταν εφαρμόζεται
 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης

Συνδυαστικότητα: ---

Σήμανση τοξικότητας: Xi-Ερεθιστικό

Φράσεις κινδύνου:

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
 ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως
 ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό. Πλυθείτε
 αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά
 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και
 καλέστε αμέσως γιατρό. Να λαμβάνετε ενεργός άνθρακας.

Για το γιατρό:

Συμπτώματα: ακαμψία, υπνηλία, δυσκολία συντονισμού κινήσεων, σπασμοί, τοπική υπερευαισθησία

Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του σκευάσματος συστήνεται πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα και συγχρόνως προστασία των αναπνευστικών οργάνων.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης των δραστικών ουσιών στο Παράρτημα I του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.